

ଧାନ ଫସଲର

ରୋଗ-ପୋକ ପରିଚାଳନା



ଆଲୋଚ୍ୟ:

ଡ. କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

ସଂପାଦନା:

ଡ. ମାନସୀ ଭୋଳ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷିବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦେବଗଡ଼



ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଧାନ ଫସଲର ରୋଗ-ପୋକ ପରିଚାଳନା

ଲେଖକ :

ଡ. କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

ସଂପାଦନା :

ଡ. ମାନସୀ ଭୋଳ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦେବଗଡ଼

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ :

ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୪

ମୁଦ୍ରଣ :

ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର,

ଫୋନ୍ ୯୪୩୭୦୭୭୩୩୭

By:

Dr. Kshirod Kumar Biswal

Scientist, Plant Protection

Edited by :

Dr. Manasi Bhol

Sr. Scientist & Head

Krishi Vigyan Kendra, Deogarh

Published by :

Krishi Vigyan Kendra,

Deogarh

First Edition

January.2024

Printed by :

Ankita Graphics, Bhubaneswar.

Ph : 9437077337

ଧାନର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ-ଯୋକ ଓ ତା'ର ପରିଚାଳନା

ଧାନର କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋକ

ଧାନ ଫସଲରେ ତଳି ଘରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋକର ଶୁକ ମଞ୍ଜିପତ୍ରକୁ ତଳୁ କାଣ୍ଡ ପାଖରୁ କାଟିଦିଏ । ଫଳରେ ମଞ୍ଜିପତ୍ରଟି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ । କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲର ତଳକାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା କେଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋକର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ ବା ଶତକଡ଼ା ୫ ଭାଗ ଧଳା ମଞ୍ଜିପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଦମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।




ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି

୧. ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରି ମୂଳି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା
୨. ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ୭ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଘରାରେ ଦାନାଦାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା
୩. ଶତକଡ଼ା ୦.୦୨ ଭାଗ କ୍ଲୋରପାଲ୍‌ରିଫ୍‌ସ୍ ଦ୍ରବଣରେ ତଳିତେର ବିଶୋଧନ
୪. ରୋଜବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଥୋପ ବସାଇବା
୫. ମୂଳ ଜମିରେ ଦାନାଦାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଛାଡ଼ିବା
୬. ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କୀଟନାଶକ ଯଥା ବାଇଫେନଥ୍ରିନ୍, ୧୦ ଲସି ୫୦ ମିଲି କାରଟାର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪% ଜି ୨୦ କିଗ୍ରା ପ୍ୟୁରେଷିଆମାଇଡ୍ ୩୯.୩୫ ଏସ୍‌ସି ୫୦ ମିଲି କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫ ଏସ୍‌ସି ୧୦୦୦ମିଲି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନର ଲେଡ଼ାଯୋକ

ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲେଡ଼ାଯୋକର ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଦଳଦଳ ହୋଇ ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ପଡ଼ି





କାଟି ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ଗଛ ଫୁଲ ପାଖରୁ କାଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ବିଲ ଗାଈ ଚରିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ଧାନ ବିଲରେ ଏହି ପୋକ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଦମନ ପଛତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ।



ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କୀଟନାଶକ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୫୦% + ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୫ ଇସି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ ୫୦ ଇସି ୧୦୦୦ ମିଲି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କେଣ୍ଡାକଟା ପୋକ

କେଣ୍ଡାକଟା ପୋକର ଶୁକ କେଣ୍ଡା ପାଟିଲାବେଳେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଧାନକେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ପକାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ।

୧. ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକୀଟ ମାରିବା
୨. ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିର ଚାରିପଟେ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ବିଞ୍ଚିବା
୩. ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୦୦ ମି.ଲି. ହିସାବରେ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ତରଳ ବିଷ ପ୍ରତି ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨-୩ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ।



ଗନ୍ଧି ପୋକ

ଗନ୍ଧିପୋକ ଧାନ ଫୁଲ ଉଡାଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ । ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ



- ହେଲା ଧଳାକେଣ୍ଡା ବାହାରିବା, ଧାନ ଅଗାଧି ହେବା ଓ କଳାକଳା ଦାଗ ଦେଖା ଦେବା । ବୁଦ୍ଧାପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପୋକ ଦେଖିଲେ ଦମନ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ
୧. ଭୋର ସମୟରେ ବିଲରେ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 ୨. ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି ଛେଚା ଦ୍ରବଣକୁ ୫% ହାରରେ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏହି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।

୩. ଜମିରେ ପତା ଗଣ୍ଡାର ଥୋପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

୪. ଏକର ପ୍ରତି ୫୦୦ ମିଲି ମନୋକ୍ରେଟୋଫସ୍ ବା କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ

ଧାନ ରୋଇବାର ୭୦-୮୦ ଦିନ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କୀଟର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଡିକ କାଣ୍ଡମୂଳରେ ରହି ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷଣ କରିବାରୁ ଗଛ ଜଳିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୮-୧୦ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ବା ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ବା ୧୫-୨୦ଟି ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।



ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନକ୍ଷେତ



ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି



ଧଳାପିଠିଆ



ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡି

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

୧. ଚକଡା ପୋକ କ୍ଷତି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ୩-୪ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ ଓ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୨. ଗଛ କନ୍ଦି କଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡିବ ଓ କୀଟ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ।

୩. ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରେ।

୪. ଫ୍ଲୋରିକାମାଇଡ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁଜି ୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଆଇଓମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ ଡବ୍ଲୁଜି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଇନୋଟିଫୁରନ୍ ୨୦ ଏସ୍ଜି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୫୦୦ ପାଣିରେ ଓ ମୂଳଭାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ବଙ୍ଗାପୋକ

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଧାନ ଫସଲରେ ବଙ୍ଗାପୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମାଗଟ୍ ଗୁଡିକ ପତ୍ର ମେଲିବା ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ର ଆଛଦକୁ କଣାକରିବା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତପତ୍ର ଆଛଦ ପିଆଜ ଶିଷ୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଥୋଡପତ୍ର ବାହାରିବା ପରେ ବଙ୍ଗାପୋକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଧାନ ଜମିରେ ଶତକଡା ୫ ଭାଗ ପିଆଜ ଶିଷ୍ଟା ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ।



ବଙ୍ଗାପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶଷ୍ୟ



ବଙ୍ଗାପୋକ ଶୂକ




ବଙ୍ଗାପୋକ

୧. ଜମିରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ।
୨. ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମାରେ ଶଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାନାଦାର କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ଗାଜି ୨୫ କିଗ୍ରା କାର୍ବୋସଲ୍‌ଫାନ୍ ୨୫ ଇସି ୧୦୦୦ ମି.ଲି., ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫ ଏସ୍‌ସି ୧୦୦୦ମିଲି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ

ଧାନ ଗଛ ପିଲ ମାରିବା ସମୟରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ଶୁକ ଧାନ ପତ୍ରର ଦୁଇ ଧାରକୁ ଅଗ ଆଡୁ ମୋଡ଼ି ତା'ଭିତରେ ରହି ସବୁଜ ଅଂଶକୁ କୋରି କୋରି ଖାଇଯାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଧଳା ଝାଡୁ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ଟି ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ଶୁକ ଦେଖିଲେ ଦମନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।



ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ



ପୋକର ଶୁକ



ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦା

୧. ଜମିରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ।
୨. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦,୦୦୦ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ୮-୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଇଥୋକ୍ସକାର୍ବାବି ୧୫.୮ଇସି ୨୦୦ ମିଲି, ଏମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ୧.୯ ଇସି ୪୨୫ ମିଲି, କ୍ଲୋରାଣ୍ଟାନିଲ୍‌ଫେର ୧୮.୫ ଏସ୍‌ସି ୨୦୦ ମିଲି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ନଳୀଫୋକ

ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଖରା ଦିନିଆ ଫସଲରେ ଗଛ ପିଲ ମାରିବା ସମୟରେ ନଳୀ ଫୋକର ଶୁଳ୍କ ଧାନ ପତ୍ରର ଧାରରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଟି ନଳୀ ତିଆରି କରିଥାଏ । ନଳୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ସବୁଜ ଅଂଶକୁ ଖାଇଯିବା ଫଳରେ ପତ୍ର ଧଳା ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନକ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ ଟି ନଳୀ ଦେଖିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।



ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫୋକ


ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନକ୍ଷେତ

୧. ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ ।
୨. ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାଫା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ପ୍ରତି ୭ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨/୩ ଥର ଜମିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।
୩. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫ ଏସ୍ ସି ୧୦୦୦ ମି.ଲି., ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକ୍ସାକାର୍ବ ୧୪.୫ ଏସ୍ ସି ୫୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ ୫୦ ଇସି ୧୦୦୦ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରଖୁଆ ଫୋକ

ବର୍ଷାଦିନେ ପତ୍ରଖୁଆଫୋକ ଗଛ ପିଲ ମାରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଫୋକଗୁଡ଼ିକର ଶୁଳ୍କ ଧାନ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ

୧. ଜମିରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ ।
୨. ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାଫା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ପ୍ରତି ୭ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨/୩ଥର ଜମିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।



୩. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୧.୯ ଲସି ୪୨୫ ମିଲି, ଇଥୋକ୍ସକାର୍ବ ୧୪.୫ ଏସ୍ସି ୩୫୦ ମିଲି କିମ୍ବା ସ୍ବାଇନେଟୋରାମ୍ ୧୧.୭ ଏସ୍ସି ୫୪୦ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

୪. ଏକର ପ୍ରତି ୧ ରୁ ୨ କି.ଗ୍ରା ହିସାବରେ ବିଟି ଜାତୀୟ ବାଜାଣ୍ଟ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଧାନର ଦହିଆ ପୋକ ଓ ତାର ଦମନ

ଖରା ଦିନିଆ ଫସଲରେ ଏହି ପୋକ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଗଛ ପିଲ ମାରିବା ସମୟରେ ଏହି ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ମେଞ୍ଚାମେଞ୍ଚା ହୋଇ ପତ୍ରଆଛଦ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ରସ ଶୋଷିନେବା ଫଳରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ।



ଦହିଆ ପୋକର ଅର୍ଦ୍ଧକ



ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ବୁଦା

ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦାରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ହିଡ଼ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜମି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଯାଏ।

୧. ଦହିଆ ପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

୨. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏସିଫେଟ୍ ୭୫ ଏସ୍ସି ୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍, ଥାଇଓମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ ଡବ୍ଲୁଜି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୧୭.୮ ଏସ୍ସି ୧୪୦ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଧାନର ବିରିହା ପୋକ ଓ ତାର ଦମନ

ବିରିହା ପୋକ ତଳିଘରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ରୋଜବାର ଦେହମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ ପତ୍ରର ସବୁଜ ଅଂଶକୁ ସିଧା ସିଧା ଖାଇ ଯିବା ଫଳରେ ପତ୍ରରେ



ବିରିହା ପୋକ



ବିରିହା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫସଲ

ସମାନ୍ତରାଳ ଧଳା ଧଳା ଗାର ଦେଖାଯାଏ । ତଳିଘରାରେ ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉଥରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବିରିହା ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଧାନ ଗଛକୁ ରକ୍ଷାକରିବାକୁ ହେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଜମାମେକ୍ତିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ୧.୯ ଇସି ୪୨୫ ଗ୍ରାମ ଇଥୋକ୍ସକାର୍ବ ୧୫.୮ ଇସି ୨୦୦ ମିଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡାସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫ ଇସି ୨୫୦ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ ଫସଲରେ ମହିଷା ରୋଗ

ଧାନ ଫସଲର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏବଂ ଡାଲୁଆ ଧାନରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ଧାନପତ୍ରରେ ଆଖି ଭଳିଆ ଦାଗମାନ ଦେଖାଯାଏ । କେଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରତି ପତ୍ରରେ ୨ ରୁ ୫ ଟି ଦାଗ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ।



ପତ୍ର ମହିଷା



ଗଣ୍ଡିମହିଷା



ଥୋଡ଼ ମହିଷା



୧. କମ୍ ପରିମାଣର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
୨. ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ବିହନ ପିଛା ୧.୫ ଗ୍ରାମ ବାଉଁଶିନ୍ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
୩. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଟେବୁକୋନାଜଲ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ ଜି ୧.୫ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର କିମ୍ବା ପାଇରାକ୍ଲୋଥେବିନ୍ ୧୦୦ ଜି ୨.୦ ମିଲି/ଲିଟର କିମ୍ବା ପିକୋକ୍ଲିଥେବିନ୍ ୨୨.୫ ୨ ଏସ୍ସି ୧.୫ ମିଲି/ଲିଟର ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଧାନର ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ

ଧାନ ଫସଲର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପତ୍ର ଉପରେ ଛୋଟଛୋଟ ଗୋଳାକାର ଲାଲ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଚାରିପଟେ ସୁନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାର୍ଶ୍ଵଛାୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଭଳି ଶହ ଶହ ଚିହ୍ନ ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପତ୍ରରେ ୧୦ଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ କବକନାଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।



ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ

ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗ୍ରାଉସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ୧୮% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୬୨% ୨.୦ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିନେବ ୭୦ ଡବ୍ଲୁପି ୩.୦ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଧାନର ପତ୍ର ଆଛଦପୋଡ଼ା ରୋଗ

ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ପତ୍ର ଆଛଦରେ ବୋତା ସାପକାତି ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗ, କାଦୁଆ ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି



ଆଛଦପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷେତ ଓ ବୁଦା

ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାଡିଯାଏ। ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ମିଶିଗଲେ ତଳ ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ହୋଇ ପୋତି ଗଲାଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତଳିଘରରେ ତଳି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ମରେ।

ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ହେକ୍ଟାକୋନାଜୋଲ୍ ୫ ଏସ୍‌ସି ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫ ଇସି ବା ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ୩୫ ଏଲ୍ ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାକ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଧାନର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର

ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ବେଶିଦିନ କୁମାରତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପକାଇଲେ, ପିଲ ପକାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ବେଶି ଦେଖାଯାଏ। ପତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ବା ଉଭୟ ଧାରରେ ପାଣି ଛାପିଲାଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି ପୋଡ଼ା ଅଂଶ ତଳକୁ ଓ ମଝି ଶିରା ଆଡ଼କୁ ମାଡିଯାଏ। ପତ୍ରର ଧାର ଢେଉ ଢେଉକା ଦେଖାଯାଏ।



ଧାନର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନବିଲ

- ୧) ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଜମି ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ୍।
- ୨) ଏକର ପିଛା ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ୩) ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ସେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ସହିତ ୧୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଧାନର ପତ୍ର ଆଛଦପଟା ରୋଗ

ଧାନକେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଠାରୁ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗ ବେଶି ଦେଖାଯାଏ। ଥୋଡ଼ ପତ୍ରର ଆଛଦପଟା ଏହା ବେଶି ହୁଏ। କେଣ୍ଡା ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ ଲାଗିଲେ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଥୋଡ଼ ପତ୍ରର ଆଛଦ ଚକୋଲେଟ୍ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୁଏ। କେଣ୍ଡା ଅଧାଅଧି ବାହାରେ, ଯଦି ବାହାରେ ତେବେ ସେଥିରେ ଫମ୍ପା ଧାନ ଥାଏ। ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଗମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଭଳି ୩ରୁ ୫ଟି ଥୋଡ଼ ପତ୍ରଆଛଦ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ୍।



ପତ୍ର ଆହ୍ଲାଦପତ୍ର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନଗଛ

ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି ବା ୫୦୦ମିଲି ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫ ଇସି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଧାନର ସାଆରା ରୋଗ

କେଣ୍ଡା ପକାଇବା ସମୟରେ ବେଶିଦିନ ଥଣ୍ଡାପାଗ ରହିଲେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଡିପ ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଧାନରେ ଏହି ରୋଗର ମାତ୍ରା ଅଧିକ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନର ଗର୍ଭାଶୟ ଫୁଲିଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଡିମାଡିମା ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ହୋଇଯାଏ । ମଞ୍ଜିଦ୍ୱାରା ଏହିରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।



ସାଆରା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନକେଣ୍ଡା


କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିରାଇଡ୍ ୭୭ ଡବ୍ଲୁ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ବା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ୨୦.୪ + ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟେବିନ୍ ୬.୮% ୨.୦ ମିଲି/ଲିଟର ବା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ୧୮% + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୧୪.୪% ଏସ୍‌ସି ୨.୦ ମିଲି/ଲିଟର ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ ଫସଲର ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ-ପୋକ ପରିଚାଳନା

୧. ଖରାଟିଆ ଚାଷ, ୨. ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଥିବା ବିହନର ବ୍ୟବହାର
୩. ପହୁଞ୍ଚିଲାରେ ଦାନାଦାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ତଳିତେର ବିଶୋଧନ



ସଜା ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର



ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ୍

୪. ସଅଳ ରୁଆ, ୫. ଫେରୋମୋନ୍ ବା ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର

୬. କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

୭. ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟର ପ୍ରୟୋଗ

୮. ଜୈବିକ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ

୯. ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରି ବଛାବଛା ରାସାୟନିକ
ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ



ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ମାଛି



ପାଣିରେ ଔଷଧ ମିଶ୍ରଣ



ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ



ଅନୁମୋଦିତ ଧାନ ବିହନ କିସମ


ଡିପଜମି : ହୀରା, କଳିଙ୍ଗ-୩, ବନ୍ଦନା, ପଥରା, ଘଞ୍ଜିଶୁରୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି

ଉଚ୍ଚ ମଝିଆଳି ଜମି: ଅନୁଦା, କୋଶାଳ, ଲଲାଟ, ଏମ୍ ଟି.ୟୁ ୧୦୦୧, ଆଇ.ଆର-୬୪

ମଝିଆଳି ଜମି : ଗୌରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତପସ୍ବିନୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ମଧ୍ୟମ ଖାଲ ଜମି: ପୂଜା, ଉର୍ବଶୀ, ମୋତି, ମଶୁରୀ

ଖାଲ ଜମି: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ରାମଚଣ୍ଡି, ସି.ଆର ୧୦୦୯, ଜଗବନ୍ଧୁ, ସି.ଆର ୧୦୧୪



ଧାଡ଼ିରୁଆ



‘ଶ୍ରୀ’ ପ୍ରଣାଳୀ



